

QUELQUES DENDROBIUM NOUVEAUX D'INDO-CHINE,

PAR M. F. GAGNEPAIN.

L'étude de ce genre, difficile par le grand nombre des espèces, m'a été notablement facilitée par les excellents dessins analytiques de A. Finet et par les déterminations qui portent sa signature dans l'herbier du Muséum. Même après lui, je puis donner quelques descriptions d'espèces que je crois nouvelles après avoir comparé les plantes : 1^o à celles de l'herbier général ; 2^o aux descriptions des 571 espèces de la monographie de Krænzlin, parue en 1910 dans le *Pflanzenreich*; 3^o aux descriptions des nombreuses espèces parues depuis lors (plus de 200 seulement pour les terres avoisinant l'Indo-Chine).

Malheureusement l'élimination des 200 espèces n'a pu être complète, car certains recueils n'existent ni dans la riche bibliothèque du Laboratoire, ni dans celle plus importante du Muséum, ni même en France dans aucune bibliothèque publique.

Dans ces conditions, il existe quelque aléa dans la publication d'espèces nouvelles.

Je souhaite longue vie aux 11 suivantes, pour l'existence durable desquelles je n'ai pu faire davantage.

Dendrobium banaense Gagnep., n. sp.

Herba 13 cm. circiter atta. Caules ima basi paullulo bulbosi, supra teretes gracili, e medium dilatato-compressi, infra apicem aphylli (3 cm.), floriferi. Folia disticha, scalpelliformia, linearis-acuminata obtusa, vix falciformia, recurva, 20-25 mm. longa, 5-6 lata, 5-8 mm. remota, vaginis lamina destitutis oblique acutis. Inflorescentiae terminalis flores albidi, centro purpurei, solitarii, gemmo minutissimo squamoso enati, minuti; pedicello 3 mm. longo, erecto. — Sepalum dorsale ovatum, suboblusum, 3,5 mm. longum, 1,75 latum, 5-nervatum; sep. lateralia sepalo dorsale similia, 3,5 mm. longa, 2,5 lata ad mentum 4 mm. decurrentia, 5-nervata. Petala ovalo-lanceolata, 3,25 mm. longa, 2 mm. lata, 3-nervata, nervis anastomosantibus. Labellum longe (3 mm.) unguiculatum, ad mennum enascens, rhombeum, obtuso-retusum, margine undulatum, 7 mm. longum, 5 latum. Coturna 1 mm. longa, valida, stelidiis apice ægre convexis,

Bulletin du Muséum, 2^e s., t. II, n° 2, 1930.

appendicem dorsalem æquantibus; operculo conico-convexo, anlice posticeque emarginato; mento incurvato, 4 mm. vix longo.

Annam : Ba-na, près Tourane, 1.000 m. alt., n° 7373, (*Poilane*).

De la section *Aporum*, du groupe des *Hemiphylla*, cette espèce se place vers le *Dendrobium acinaciforme* Roxb. dont elle diffère par de multiples caractères, ainsi que de toutes celles qui l'environnent.

Dendrobium Bonianum Gagnep., n. sp.

Pseudobulbi ovoïdeo-cylindrici, 5 cm. longi, 15-20 mm. crassi, in sicco costulati, tempore florum 3 cm. longi, apice bifoliati. Folia linearis-lanceolata, in petiolum canaliculatum attenuata, apice attenuato-obtusa vel acuta, 9-25 cm. longa, 2-5 cm. lata, membranacea petiolo 3-4 cm. longo. Inflorescentis solitaris terminalis, racemosa, floribunda, 4-15 cm. usque 18 cm. tempore fructuum longa; bracteis squamiformibus minutissimis, pedicellis 3-4 mm. longis, floribus numerosis usque 18, albo-viridibus, sed labello apice carminato, 20 mm. circa longis. Sepalum dorsale linearis-ovalum, obtusum, 10 mm. longum, 2.5 latum, 5-nervatum; lateralia triangulo-obtusa, 7 mm. longa, 4 mm. lata, ad mentum longe (4 mm.) decurrentia, 5-nervata. Petala linearis-lanceolata, obtusa, 7 mm. longa, 2-5 lata, 3-nervata. Labellum ambitu obovalum, 8 mm. longum, 6 latum, trilobatum; lobis laterales obliusi, decurrentes, terminalis semi-orbicularis, vix emarginatus, 3 mm. latus, disco trilamellato, lamellis longitudinalibus supra terliam partem infimam valde undulato-plicatis. Columna 3 mm. longa, stelidiis haud prominentibus, molliter undulatis, operculo obliquo, mox bifariam diviso, mento 3-5 mm. longo cum columna rectangulo. Capsula clavata, 14 mm. longa, 5-7 mm. lata, pedicello 3.5-4 mm. longo.

Tonkin : région de Hanoï, à Vo-xa, n°s 2844, 3062 (*Bon*).

Ressemble au *D. canaliculatum* R. Br. par son aspect général, les 3 lames chiffonnées de son labelle et la taille de ses fleurs, mais en diffère : 1^o par les feuilles larges, lancéolées, au nombre de 2 seulement ; 2^o par l'inflorescence plus courte ; 3^o par le labelle carminé au sommet et obtus ; 4^o par les veines des lobes latéraux absentes, donc ni proéminentes ni colorées ; 5^o par le labelle égalant les sépales et pétales.

Dendrobium cacuminis Gagnep., n. sp.

Rhizoma repens, pseudobulbis distichis, numerosis, densis comitatis. Pseudobulbi ovoideo-conici, 3 cm. longi, 1,5-2 cm. crassi, basi squamis tatis, striatis, firmis, fragitibus cincti, foliis 2, apice coro-

nati. Folia linearis oblonga, basi attenuata, sessilia, apice obtusa leviterque emarginata, 11 cm. longa, 15-20 mm. lata, tenuiter nervibus in sicco striata. Inflorescentiae 1-2, terminales ex axillis foliorum oriundæ, racemosæ, elongatæ, multifloræ, 25-30 cm. longæ, supra basin floriferæ, bracteis ovato-acutis, 3 mm. longis, persistentibus, pedicellis 15-17 mm. longis, erectis dein patentibus, floribus 12-17, apertis 4 cm. diam. — Sepalum dorsale lineare, obtusum, 25 mm. longum, 5 latum, nervis 5 paralellis; lateralia simillima, 21 mm. longa, Petala sepatis conformia, leviter falciformia et lanceolata, 22 mm. longa, 5 mm. lata, nervis 5, parallelis. Labellum ambitu ovalum, 3-lobum, 12 mm. longum, 5 mm. latum, lobis laterilibus truncatis decurrentibus, terminati ovato-obtuso subrotundo, 5 mm. longo latoque, leniuler piloso-papilloso; disco infra medium tricostato, costis lateralibus loratis ad basin canaliculatis 5 costis efficientibus, abrupte desinentibus, intermedia angustiora. Columna 6 mm. longa, stelidiis cum appendice dorsali cohaerentibus, laminam triangulam figurantibus; operculo galeato, mento perbrevi, 1 mm. vix longo.

Annam : montée des Pics Lang-bian, 2.100 m. alt., n° 378 (Evrard).

De la section *Botbodium*, cette espèce est remarquable par la présence constante de 2 feuilles. Elle diffère de *D. Schneideræ* Bailey : 1^o par les feuilles 5 fois plus longues et 3-4 fois plus larges ; 2^o par les inflorescences à fleurs plus nombreuses, jusqu'à 17; 3^o par le pédicelle près de 4 fois plus long; 4^o les fleurs beaucoup plus grandes; 5^o le lobe terminal du labelle non en coussin.

Curieuse espèce ayant ses affinités plutôt avec ses congénères australiennes.

Dendrobium dalatense Gagnep., n. sp.

Herba 30 cm. et ultra alta. Caules in parte media compressi, apice aphyli floriferique, obscure 4-anguli. Folia disticha, ensiformia, linearia, in uno latere 6 cm. remota, leviter falciformia, recurvaque, 4 cm. longa, 5-6 mm. lata, paullulo acuminata, obtusiuscula, cicatrici verticali ad apicem vaginarum, vaginis lamina destitutis, apice deltoideis. Inflorescentia terminalis; flores albi solitarii gemmo squamoso 5 mm. longo, ovato-oblongo, bracteis imbricatis, brunneis, 3 mm. longis, supremis mucronatis enati; pedicello 1 cm. longo, patente, arcuato suffulti. — Sepalum dorsale, ovato-triangulum, subobtusum, 7 mm. longum, 4 mm. latum, 7-nervatum; sep. alteralia triangula, obtusa, 6 mm. longa, 4 mm. lata, ad mentum 13 mm. decurrentia, 7-nervata. Petala lanceolata, obtusa, 6 mm. longa, 2.3 lata, 3-nervata, nervo medio ramoso. Labellum longe cuneiforme, 15 mm. longum, infra apicem 7,5 mm. latum, apice rotundum superficie

emarginatum, nervis numerosis subparallelis percursum. Columna 1.5 mm. longa lataque, stelidiis subnullis ægre convexis, appendice dorsali triangulo brevi; operculo conico oblique truncato, mento lato falciforme, 13 mm. longo.

Annam : Lang-bian, à Dalat n° 40333 (A. Chevalier).

Cette espèce paraît se rapprocher du *D. scalpelliforme* T. et B. dont elle diffère : 1^o par les feuilles longues de 4 cm. seulement ; 2^o par les fleurs blanches ; 3^o par les sépales non aigus ; 4^o par les pétales ni linéaires ni plus courts que les sépales ; 5^o par le labelle non crispé ; 6^o par la colonne jamais bicalleuse.

De la section *Aporum*, du groupe *Hemiphylla*, elle est remarquable par la grande distance qui sépare ses feuilles et par la longueur de son inflorescence terminale.

Dendrobium Evrardii Gagnep., sp. n.

Caules debiles, patentes ascendentesque, 20-40 cm. longi; radices validi, caulum crassitudine; vaginæ sat laxæ, ore dilatatae, cum foliis plus minusve nigro-hirsutæ. Folia linearis-oblonga, attenuato-obtusa, apice oblique emarginata, 6-7 cm. longa, 10-12 mm. lata; nervi crassiores 5. Inflorescentiae ad caules foliacei enatae, suberminalis; flores solitarii albidi, majusculi, gemmo squamoso, oblongo-oriendi, pedicello 35 mm. longo; bracteis 3-8 mm. longis, subacuminatis, nigro-hirsutis.— Sepalum dorsale oblongum, acutum submucronatum, 25 mm. longum, 8 mm. latum, nervis 7 anastomosantibus; sep. lateralia triangulo-acuminata, mucronata; s. dorsale æquilonga, æquilata, secus mentum gracitem 25 mm. decurrentia, nervis 7 anastomosantibus. Petala tate obovata, apice rotunda, 28 mm. longa, 20-22 supra medium lata, nervis lateralibus ramosissimis. Labellum cuneiforme-ovatum, ad medium menti insertum, 3-lobum, 32 mm. longum, 24 latum, margine ad apicem crenulatum, multinerium; lobis lateralibus rotundatis decurrentibus, 10 mm. latis, lobo terminali ambitu orbiculari, sed conspicue 2-lobulato, 12 mm. diam.; nervo medio prominulente. Columna 7 mm. longa, stelidiis subdeltoides, margine dorsali conspicue 3-dentato, appendice dorsali minoribus; mento gracile, inflexo; 25 mm. longo.

Annam : Lang-bian, montée des Pics à 2.100 m., n° 389 (Evrard).

De la section *Nigro-hirsuta*, cette espèce a quelque ressemblance avec *D. longicornu*, mais elle s'en distingue au premier examen par son labelle non fimbrié, mais bilobulé au sommet. Il ne peut se rapporter ni à *D. Christyanum* Rchb., ni à *D. Williamsoni* Day et R. ni à aucune espèce dont j'ai vu les échantillons ou lu la description.

Dendrobium intricatum Gagnep., n. nov.; *D. hymenophyllum* (non Lindl.) var. *cambodicum* Finet; *D. uniflorum* Finet (non T. et B.); *D. prostratum* Cost. in Bull. Mus. Paris, 1917, p. 52 (non Ridley).

Caules aggregali, teretes vel sensim ad medium clavati et apicem attenuati, rimosi, alteri foliacei, alteri floriferi. Folia linearis-lanceolata, apice acuminata acutissimaque, basi attenuato-sessilia, 5-10 cm. longa, 10-15 mm. lata, 5-nervata. Inflorescentiae racemi laterales brevi, 2-3-flori, pedunculo 1 cm. vix longo, bracteis 3 mm. longis, obtongis, pedicello 15 mm. longo, floribus roseis, haud inter majoribus. — Sepatum dorsale ovalo-oblongum, obtusissimum, 10 mm. longum, 5 latum, 7-nervatum nervis anastomosantibus; sep. lateralia subsimilia, sed ad mentum longe (7 mm.) decurrentia. Petala obovata, basi attenuata, apice valde rotunda, margine denticulata, 12 mm. longa, 6.5 lata, 6-nervata, nervis lateralibus ramosis. Labellum obovatum longe et anguste unguiculatum, apice rotundum, vix emarginatum, margine denticulatum, totum 25 mm. longum, 10 mm. latum, disco tæniam longitudinalem leviter prominentem eformante; crista \wedge forma ad basin unguem sita. Columna 3 mm. longa lataque, steliis ovatis, oblique emarginatis, appendice dorsali majoribus, mento 15 mm. longo, attenuato obtuso, incurvo semiorbiculari, longitudinaliter bicamerato, apice fistuloso; operculo orbiculari, leviter convexo, margine reflexo.

Cambodge : monts Camchay (Pierre); Préacan (Harmand). Cochinchine : île Phu-quoc (Pierre) — Java?

Cette espèce a eu de multiples vicissitudes. Sur la foi de Pierre qui croyait posséder le *D. uniflorum* dans une plante de Java, Finet lui compara les échantillons ci-dessus et les nomma à tort *D. uniflorum* T. et B.

Comparant l'échantillon de Préacan, récolté par Harmand, avec *D. hymenophyllum* Lindl., il le reconnut différent de cette espèce et le lui annexa comme var. *cambodianum* Finet. Ce n'est pas *D. hymenophyllum* Lindl.

Tous les échantillons, ci-dessus désignés, sauf peut-être celui de Java, sont conspécifiques et ne sont ni *D. uniflorum* T. et B. ni *hymenophyllum*. Ce n'est pas *D. uniflorum*, car celui-ci est un *Aporrum*. Ce n'est pas *D. hymenophyllum* qui a des grappes longues et multiflores. Ce n'est aucune espèce à moi connue par les échantillons ou la description. La forme du menton le place auprès de *D. hamatum* Rolfe, qui a des inflorescences plus floribondes, des feuilles plus larges, des sépales d'autre forme, des pétales aigus, un labelle environ 2 fois plus court, un menton épais et obtus.

Dendrobium langbianense Gagnep., n. sp.

Herba nana, 5 cm. alta. Caulis 15-20 mm. altus, vaginis foliaceis 3-4 vestitus, inflorescentiis 1-3, axillaribus coronatus. Folia 4-6, linearis-oblonga, apice leviter emarginata, 1-3 cm. longa, 3-5 mm. lata, intermedia majora. Inflorescentiae 1, raro 3, subterminales, racemosae 2-4 saepe 3 cm. longae, pluriflorae, bracteis ovalo-aculis, 2-2.5 mm. longis, pedicellis 4.5 mm. longis, erectis deinde patentibus vel reflexis, floribus 4-5 pallidis, 1 cm. diam. Sepalum dorsale lineare, acutissimum, 8 mm. longum, 2 mm. latum, 5-nervatum, lateralia simillima sed secus mentum decurrentia. Petala lanceolata, acuta, 7 mm. longa, 2 mm. lata, 5-nervata. Labellum ovato-lanceolatum, basi cuneatum, 9 mm. longum, 5 mm. latum, haud lobatum, margine regulariter grosseque dentatum; disco longitudinale, 3-nervato, nervis leviter ad apicem divaricatis, abrupte ad tertiam partem supremam desinentibus. Columna brevis, stelidiis obtuso-emarginatis, appendice dorsali brevibus, operculo convexo, haud valde prominente, mento 5.5 mm. longo.

Annam : Lang-bian, n° 1936 (Eberhardt).

Cette espèce ressemble beaucoup à *D. porphyrochilum* Lindl. mais s'en distingue : 1^o par le labelle fortement denté, ovale largement, à 3 nervures sur la zone médiane; 2^o par les sépales 5-nervés; 3^o par les gaines inférieures pourvues d'un limbe foliaire comme les autres. Par l'aspect, elle semble une forme naine du *D. criæflorum* Griff., mais les pétales ne sont pas linéaires et le labelle n'est pas nettement trilobé. Au lieu que le labelle soit tronqué dans notre espèce, il est plutôt un peu aigu.

Dendrobium nhatrangense Gagnep., n. sp.

Rhizoma repens, gracilis, ad nodos radices caulesque emittens. Caules graciles, teretes, fotiacei vel aphylli, 20-30 cm. longi; vaginæ laxæ, striatæ, purpurascentes. Folia 3-7, ad apicem sistentia, 15-20 mm. distantia, linearia graminiformia, longe acuminato-acuta, basi attenuata subsessilia, 5-7 cm. longa, 6-8 mm. lata, nervis striata. Inflorescentiae flores solitarii, ad apicem caulinum aphyllorum siti, vagina orientes, rosei, sat minuti, pedicello 5 mm. longo. — Sepalum dorsale oblongum, oblusum, 10 mm. longum, 3 mm. latum, 5-nervatum; sep. lateralia triangulo-acuta, 11 mm. longa, 4 lata, ad mentum 10 mm. decurrentia, 5-nervata. Petala linearia, 11 mm. longa, 2.5 supra medium lata, 3-nervata. Labellum subtrilobum vel rhombicum, unguiculatum, apiculato-obtusum, 12-13 mm. longum, 7.5 mm. latum, supra piloso-papillosum, margine sinuatum. Columna 2-5 mm. longa, stelidiis triangulo-sinuosus, appendice dorsale majoribus, mento 10 mm. tongo, inflexo, subacuto, labellum ad tertiam

pariem supremam gerente; operculo prominens obluso, 1.5 mm. diam.
1 mm. alto.

Annam : n. de Ninh-hoa, versant S. E. du massif de la Mère et l'Enfant, prov. Nhatrang (*Poilane*).

Cette espèce nouvelle appartient au sous-genre *Graslidium* et à la section *Angustifolia*. Elle diffère du *D. Calhcattii* Hook : 1^o par la présence des fleurs sur des tiges aphyllées ; 2^o par des feuilles acuminées, non lobulées au sommet ; 3^o par les fleurs rosées ; 4^o par le labelle non oblong-lancéolé et sans carène médiane ; 5^o par les stélidies à la fois acuminées et flexueuses.

Dendrobium oxyanthum Gagnep., n. sp.

Herba 40-100 cm. alta, rupicola vel epiphytica. Caules ægre ad imam basin bulbosi, supra subcylindrici, vel ad medium leviter incrassati, foliosi, vel aphylli florigerique; vaginis apice sat apertis subinfundibuliformibus. Folia oblongo-lanceolata, basi attenuata, apice longe acuminata, acuta (haud biloba), 6-9 cm. longa, 12-17 mm. lata, membranacea. Inflorescentiae laterales, racemosæ, 3-4 cm. longæ, rigide flexuosa, bracteis lanceolato-aculis, 5 mm. longis, persistentibus, patentibus vel reflexis; pedicello cum ovario 14 mm. longo, erecto; floribus 2-8, 15-20 mm. longis, violaceis, odore pergrato. — Sepalum dorsale triangulo-acuminatissimum, 17 mm. longum, 5 mm. latum, 7-nervatum, lateralia subsimillima, sed basi ad mentum decurrentia, 12 mm. lata, 7-nervata. Petala lanceolata, acuminatissima 15 mm. longa, 4 mm. lata, 5-nervata. Labellum breviter unguiculatum, rhomboïdeum, abrupte acuminatissimum, subtrilobatum, intus tenuiter papillosum, 15 mm. longum, 7-8 latum, disco transversati inter unguem et laminam elevato. Columna valida, stelidiis amplis, apice subbilobis, denliculatis; operculo mitreformi, bilobo, papillis crystallino; mento lato, 8-9 mm. longo, obtuso.

Annam : col des Nuages, près Tourane, n° 7937; massif de Dong-chc, prov. Quang-tri, n° 10620 (*Poilane*).

De la section *Pedilonum*, du groupe *Glomerata*, cette espèce paraît devoir se placer auprès des *D. violaceum* Kranzl., *cyanocentrum* Schlecht., *xanthomeson* Schlechl., *Victoriæ-Reginæ* Loher, *cavipes* J.-J. Sm. dans la classification de Krænzlin. Elle est très remarquable par ses sépals, pétales, labelle, tous finement acuminés; dc là, son nom.

Dendrobium Rivesii Gagnep., n. sp.

Caules erecti, basi ægre bulbosi, conspicue ad medium fusiformes,
40-50 cm. alti, leviter sulcati, vaginæ sat laxæ, scariosæ, fragiles.
Folia linear-lanceolata, basi attenuata, sessilia, apice acuminato-

acuta, 8-11 cm. *longa*, 12-14 mm. *lata*, 7-nervata. *Inflorescentiae racemus* 7 cm. et ultra longus, subterminalis, bracteatus, bracteis 10-15 mm. *longis*, *ovalo-oblongis*, *pedicello* 3-4 cm., *floribus aurantiacis*, 4 cm. diam. — *Sepalum dorsale oblongo-lanceolatum*, *obtusum* 20 mm. *longum*, 5 *latum*, 5-nervatum; s. *lateralia triangula*, 25 mm. *longa*, 5 ad basin *lata*, *acuminato-acuta*, 5-nervata. *Petala obovalo-lanceolata*, 23 mm. *longa*, 7 *lata*, 5-nervata, *nervis lateralibus ramosis*. *Labellum rhombicum*, *obtusissimum*, *obverse subtriangulum* 2 cm. *longum latumque*, *marginibus fimbriato-denticulatis ad basin inflexis*, *tubum efformantibus*, *ore tenuiter ciliatum*, *centro atropurpureum*, *basi purpureo striatum*, *disco lineis 3 prominentibus ornatum*. *Columna* 4 mm. *alta*, *stelidiis triangulo-retusis*, *apice emarginatis* *appendice dorsati minoribus*, *mento breve*, 5 mm. *longo*, *operculo prominente truncato*, 1.5 mm. *lato altoque*.

Tonkin : résidence supérieure de Hanoï; Son-La, vallée de Nam-ma (*Rives*).

Cette espèce doit être placée dans la section *Crumenata*. Par son labelle simple, elle est voisine des *D. papilio*, *plebejum*, *gcdleanum* d'après le travail de Krænzlin in *Pflanzenreich*. Je n'ai pu la rapporter à aucune des espèces contenues dans l'ouvrage, à aucune de celles nombreuses qui ont été publiées depuis lors (1910).

Dendrobium subterrestre Gagnep., n. sp.

Herba 15-20 cm. *alta*. *Caulis* *uniarticulatus*, *apice bifoliatus floriferusque*. *Pseudobulbus cylindricus vel cylindro-conicus*, 5-13 cm. *sæpe* 7 cm. *longus*, *basi vaginis deltoideis*, *aphyllis*, *fragilibus mox evanescentibus vestitus*. *Folia terminalia* 2, *in petiotum* 1-2 cm. *longum attenuata*, *apice attenuato-obtusa*, *oblonga*, *sublanceolata*, 9-10 cm. *longa*, 2-3 cm. *lata*, *firma*, *subchartacea*, *nervis* 2-3 mm., *remotis striata*. *Inflorescentiae subterminales*, *infra folia ex gemmo squamoso nascentes*, 11-13 cm. *longæ*, *racemosæ*, *multifloræ*, *bracteis* 15 mm., *supremis* 7, *longis*, *oblongo-obtusis*, *membranaceis*, *patentibus*, *pedicellis* 2 cm. *longis*, *ascendentibus*, *floribus* 10-12, 15 mm. et ultra diam. *Sepalum dorsale ovato-lanceotatum*, *obtusum*, 9 mm. *longum*, 3 mm. *latum*, 5-nervatum; *lateralia triangula*, *acuta*, 9 mm. *longa*, 3 mm. *lata*, *secus mentum decurrentia*, 5-nervata. *Petala lanceolato-obtusa*, 3-nervata, *nervis lateralibus ramosis*, 7,5 mm. *longa* 2,6 mm. *lata*. *Labellum* 4 mm. *unguiculatum*, *abrupte ovatum*, *tritobum*, *lobis lateralibus semi-orbicularibus*, 2,4 mm. *latis*, *lobo terminati semi-orbiculari*, *inconspicue emarginato*, 4 mm. *lato*, *disco lamellis longitudinalibus undulatis constituto*. *Columna* 3,5 mm. *longa*, *stelidiis amplis apice rotundatis appendicem dorsalem æquantiibus*; *operculo convexo*, 4-locellato, *polliniis per paria 4 globosa ferruginatis*.

Cochinchine : petite pagode de Ba-scu, prov. Tay-ninh sur les détritus, sur les rochers ou arbres moussus, n° 285 (*A. Regnier*).

De la section *Dendrocoryne*, du groupe *Speciosa*, cette espèce se place non loin de *D. speciosum* Sm. Mais elle diffère du *D. speciosum*, qui a le lobe moyen du labelle aigu, du *D. delicatum* Bailey, qui l'a bilobé, du *D. falcorostrum* Fitzg. qui le porte en bec recourbé. La plupart des espèces de la section *Dendrocoryne* sont australiennes.